






Checkliste Sommerhaarkleid

Hitzestress bei Mutterkühen reduzieren

- Beurteilung zu Beginn des Sommers (spätestens Anfang Juni).
- Je wärmer es in der Region ist, desto früher sollte das Sommerhaarkleid beurteilt werden.
- Bei älteren und jüngeren Tieren kann der Fellwechsel länger dauern

Score	Behaarungsgrad	Beschreibung	Handlungsbedarf – und optionen
a		keine	nein
b		wenige Reste langer Haare an Bauch und Bug	nein
c		Reste langer Haare vor allem am Bauch, aber keine langen Haare im Bereich des Halses, des Beckens und der Beine. wenige lange Haare im Bereich der Schulter	<ul style="list-style-type: none"> • Scheuermöglichkeiten zur Verfügung stellen (z.B. Bürsten oder auch Hecken, Sträucher, o.ä.) • ggf. Gesundheitscheck bei den betroffenen Rindern
d		überwiegend Winterhaarkleid mit Ausnahmen an Hals, Schwanzansatz und ggf. Beinen	<ul style="list-style-type: none"> • Scheuermöglichkeiten zur Verfügung stellen (z.B. Bürsten oder auch Hecken, Sträucher, o.ä.) • ggf. Gesundheitscheck bei den betroffenen Rindern
e		fast vollständiges Winterhaarkleid	<ul style="list-style-type: none"> • Scheuermöglichkeiten zur Verfügung stellen (z.B. Bürsten oder auch Hecken, Sträucher, o.ä.) • ggf. Gesundheitscheck bei den betroffenen Rindern • dauerhaft betroffene Rinder von Zucht ausschließen

Ziel: hoher Anteil (ca. 60 %) Tiere in Score a und b (< 25 % Winterfell am Tier)

(Einstufung nach Durbin et al. 2020;
Zeichnungen: G. Plesch, FiBL Deutschland e.V)