Checkliste Sommerhaarkleid

Hitzestress bei Mutterkühen reduzieren

- *Beurteilung zu Beginn des Sommers (spätestens Anfang Juni).*
- *Je wärmer es in der Region ist, desto früher sollte das Sommerhaarkleid beurteilt werden.*
- *Bei älteren und jüngeren Tieren kann der Fellwechsel länger dauern*

Score	*Behaarungsgrad*	*Beschreibung*	*Handlungsbedarf – und optionen*
a		keine	*nein*
b		wenige Reste langer Haare an Bauch und Bug	*nein*
c		Reste langer Haare vor allem am Bauch, aber keine langen Haare im Bereich des Halses, des Beckens und der Beine. wenige lange Haare im Bereich der Schulter	• *Scheuermöglichkeiten zur Verfügung stellen (z.B. Bürsten oder auch Hecken, Sträucher, o.ä.)* • *ggf. Gesundheitscheck bei den betroffenen Rindern*
d		überwiegend Winterhaarkleid mit Ausnahmen an Hals, Schwanzansatz und ggf. Beinen	• *Scheuermöglichkeiten zur Verfügung stellen (z.B. Bürsten oder auch Hecken, Sträucher, o.ä.)* • *ggf. Gesundheitscheck bei den betroffenen Rindern*
e		fast vollständiges Winterhaarkleid	• *Scheuermöglichkeiten zur Verfügung stellen (z.B. Bürsten oder auch Hecken, Sträucher, o.ä.)* • *ggf. Gesundheitscheck bei den betroffenen Rindern* • *dauerhaft betroffene Rinder von Zucht ausschließen*

***Ziel**: hoher Anteil (ca. 60 %) Tiere in Score a und b (< 25 % Winterfell am Tier)*

(Einstufung nach Durbin et al. 2020;
Zeichnungen: G. Plesch, FiBL Deutschland e.V)

Gefördert durch:
Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Projektträger
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung